

Vous allez prendre un traitement par **Amoxicilline**
Jusqu'au à la posologie de

Mode d'emploi

Ce médicament est un **antibiotique** de la famille des **Pénicillines** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

La bonne utilisation est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiotique doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. En effet, l'infection peut réapparaître.



Prendre le médicament en début de repas, et à heure régulière.



Comprimés dispersibles : prendre avec un verre d'eau par voie orale.



Suspension buvable : bien agiter le flacon avant l'utilisation.



Gélules : Ne pas ouvrir, prendre avec de l'eau.



Sachet : Disperser le contenu dans un verre d'eau.

Précaution d'emploi

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique aux **Pénicillines**.



Effets indésirables

Prévention

Conduite à tenir

Diarrhées et nausées

Prendre pendant les repas.

Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours, **contactez votre médecin.**

Quelques conseils

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.
En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.
En cas de difficultés, vous pouvez contacter votre médecin ou votre pharmacien !