

Vous allez prendre un traitement par **Bactrim 800/160mg**
Jusqu'au _____ à la posologie de _____

Mode d'emploi

Ce médicament est un **antibiotique** de la famille des **Sulfamides** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

La bonne utilisation est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiotique doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. En effet, l'infection peut réapparaître.



Prendre le médicament en début de repas et **à heure régulière.**



Comprimés : prendre avec un verre d'eau. Il est possible de couper et écraser le comprimé.



Suspension buvable : bien agiter le flacon avant l'utilisation. L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable.

Précaution d'emploi

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique** aux **Sulfamides**, au **triméthoprim**e ou aux **sulfites** des médicaments injectables.



Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhées	Prendre pendant les repas.	Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours, contactez votre médecin.
Anémie (essoufflement, fatigue) / Diminution du nombre de plaquettes	Bilan biologique hebdomadaire	
Réaction allergique importante (fièvre, cloques, ulcères buccaux, rougeurs oculaires, douleurs musculaires ou articulaires).	CESSEZ de prendre ce médicament et contactez votre médecin.	

Quelques conseils

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical. En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.

En cas de difficultés, vous pouvez contacter votre médecin ou votre pharmacien !