

Vous allez prendre un traitement par **Clindamycine 300mg**
 Jusqu'au _____ à la posologie de _____

Mode d'emploi

Ce médicament est un **antibiotique** de la famille des **Sulfamides** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

La bonne utilisation est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiotique doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. En effet, l'infection peut réapparaître.



Prendre le médicament en début de repas et à **heure régulière**.



Gélules : prendre avec un verre d'eau. Ne pas ouvrir les gélules.



Suspension buvable : bien agiter le flacon avant l'utilisation. L'utilisation de la cuillère-mesure de 5ml est indispensable.

Précaution d'emploi

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique** à un type de Lincosamides.



Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhées	Prendre le médicament pendant les repas ou collations.	Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours et s'accompagne de douleurs abdominales et fièvre, contactez votre médecin.

Interactions

Certains autres médicaments ne doivent pas être pris en même temps que ce médicament car ils peuvent modifier l'efficacité de votre traitement :

→ **Ralentisseur de transit** : Imodium®, Arestal®. Conduite à tenir : ils peuvent diminuer l'absorption de votre médicament. **Prenez ces anti-diarrhéiques 2h avant ou 3/4h après votre traitement antibiotique.**

Quelques conseils

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical. En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose. En cas de difficultés, vous pouvez contacter votre médecin ou votre pharmacien !