

Vous allez prendre un traitement par **DOXYCYCLINE 100mg**
Jusqu'au _____ à la posologie de _____

Mode d'emploi

Ce médicament est un **antibiotique** de la famille des **Tétracyclines** utilisés dans le traitement de votre infection.

Il est important de se conformer à la prescription médicale.

La bonne utilisation est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiotique doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. En effet, l'infection peut réapparaître.



Prendre le médicament en début de repas et à **heure régulière**.

→ **Il ne faut pas s'allonger pendant une heure après la prise du médicament car il peut être responsable de douleurs œsophagiennes**



Comprimés : prendre avec un verre d'eau par voie orale. Possibilité de dissoudre dans l'eau.

Gélules : Possibilité d'ouvrir la gélule mais ne pas écraser les granules, prendre avec un verre d'eau.

Précaution d'emploi

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez une allergie aux **Tétracyclines**.

Effets indésirables

Prévention

Conduite à tenir

Diarrhées et nausées

Prendre pendant les repas.

Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours, **contactez votre médecin**.

Douleurs œsophagiennes

Ne pas s'allonger pendant 1 heure après la prise du traitement

Contactez votre médecin

Photosensibilisation (majore les coups de soleil)

Evitez l'exposition pendant la durée du traitement. Utilisez une protection efficace si exposition.

Consultez votre pharmacien qui vous indiquera la conduite à tenir

Interactions

Diminution de l'efficacité de la doxycycline en association avec :

- **Laitages** : Ne pas prendre le traitement avec du calcium (lait, yaourts, fromage)
- **Protecteurs gastriques**
- **Supplémentations minéraux avec fer**

→ Eviter les associations ou prendre 2h avant ou 6h après l'antibiotique

Quelques conseils

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical. En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose. En cas de difficultés, vous pouvez contacter votre médecin ou votre pharmacien !