


Vous allez prendre un traitement par **Linézolide 600mg**
 Jusqu'au _____ à la posologie de _____

 Ce médicament n'étant pas disponible en pharmacie de ville, il est nécessaire de se procurer ce traitement à la pharmacie de l'hôpital dès votre sortie de l'hôpital.

Mode d'emploi

Ce médicament est un **antibiotique** de la famille des **Oxazolidinones** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.
 La bonne utilisation est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiotique doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. En effet, l'infection peut réapparaître.



Prendre le médicament en début de repas, et à heure régulière.



Comprimés : prendre avec un verre d'eau par voie orale. Il ne faut **pas** écraser, couper ou croquer les comprimés.



Suspension buvable : bien agiter le flacon avant l'utilisation. L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable : 600mg est fournie par 30ml de suspension buvable.

Précaution d'emploi

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique au **linézolide**.



Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Goût métallique dans la bouche	Prendre pendant les repas	Contactez votre médecin si les symptômes persistent
Diarrhées		Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours, contactez votre médecin
Anémie (essoufflement, fatigue)	Bilan biologique hebdomadaire	
Fourmillements et baisse de sensibilité des extrémités.	Contactez votre médecin	
Troubles visuels		

Quelques conseils

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical. En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.
 En cas de difficultés, vous pouvez contacter votre médecin ou votre pharmacien !