

Vous allez prendre un traitement par **Ofloxacine 200mg**
 Jusqu'au _____ à la posologie de _____

Mode d'emploi

Ce médicament est un **antibiotique** de la famille des Quinolones utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

La bonne utilisation est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiotique doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. En effet, l'infection peut réapparaître.



Prendre le médicament en début de repas et à **heure régulière**.



Comprimés : prendre avec un verre d'eau. Il ne faut **pas** écraser, couper ou croquer les comprimés.

Précaution d'emploi

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique** de la famille des quinolones.

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhées	Prendre le médicament pendant les repas ou collations.	Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours et s'accompagne de douleurs abdominales et fièvre, contactez votre médecin.
Photosensibilisation (majoration des coups de soleil)	Evitez l'exposition au soleil pendant la durée du traitement.	Consultez votre pharmacien qui vous indiquera la conduite à tenir. Consulter un médecin en cas de réaction cutanée sévère.
Tendinites	Evitez de pratiquer des sports à haute intensité pendant le traitement.	Contactez votre médecin en cas de douleurs importantes des tendons notamment au niveau des pieds.
Confusions	Contactez votre médecin en cas de confusions.	

Interactions

Certains autres médicaments ne doivent pas être pris en même temps que ce médicament car ils peuvent modifier l'efficacité de votre traitement :

→ **Protecteurs gastriques** (Maalox®, Phosphalugel®, Rennie®) , **Antiulcéreux** (Kéal®, Ulcar®), **Suppléments minéraux contenant du calcium, fer, zinc, magnésium ou aluminium** (Fumafer®, Tardyféron®). Evitez ces associations ou prenez votre antibiotique 2h avant ou au moins 6h après ces médicaments.

→ Evitez de prendre ces médicaments avec du lait ou produits laitiers qui peuvent diminuer l'efficacité de votre traitement (espacer les administrations de 2-4h).

→ Il est possible que la prise de ces médicaments provoque l'apparition de nausées ou palpitations avec des boissons contenant de la caféine (thé, café...) : diminuez la consommation de ce type de boissons pendant la durée de traitement.

Quelques conseils

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.
 En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.
 En cas de difficultés, vous pouvez contacter votre médecin ou votre pharmacien !