

Vous allez prendre un traitement par
Jusqu'au _____ à la posologie de _____

Mode d'emploi

Ce médicament est un **antibiotique** de la famille des **Rifamycines** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

La bonne utilisation est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiotique doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. En effet, l'infection peut réapparaître.



Prendre le médicament à jeun, au moins ½ heure avant ou 2 heures après le repas, et à heure régulière.



Gélules : prendre avec un verre d'eau. Il ne faut **pas** ouvrir les gélules.



Suspension buvable : bien agiter le flacon avant l'utilisation. L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable : 100mg/cuillère mesure.

Précaution d'emploi

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique aux Rifamycines**.



Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Coloration en brun orangé des liquides corporels (sueur, salive, larmes, urines, selles)	Ne portez pas de verres de contact durant le traitement.	Cet effet est sans danger et réversible à l'arrêt du traitement
Diarrhées	Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours, contactez votre médecin.	
Anémie (essoufflement, fatigue)	Bilan biologique hebdomadaire	
Diminution du nombre de plaquettes		
Hépatite (nausées, perte d'appétit, fatigue, jaunisse, urine foncée)		

Interactions

Nombreuses interactions médicamenteuses.

- Merci d'informer les professionnels de santé du traitement en cours par RIFAMPICINE en cas d'introduction d'un nouveau médicament.

Contraceptifs oraux : l'efficacité peut être diminuée pendant le traitement

- Utiliser une autre méthode de contraception (préservatifs)

Anticoagulants : Diminution de l'effet de l'anticoagulant

Quelques conseils

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical. En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.

En cas de difficultés, vous pouvez contacter votre médecin ou votre pharmacien !