

Vous allez prendre un traitement par **Tédizolide 200mg**
Jusqu'au _____ à la posologie de _____



Ce médicament n'étant pas disponible en pharmacie de ville, il est nécessaire de se procurer ce traitement à la pharmacie de l'hôpital dès votre sortie de l'hôpital.

Mode d'emploi

Ce médicament est un **antibiotique** de la famille des **Oxazolidinones** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

La bonne utilisation est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiotique doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. En effet, l'infection peut réapparaître.



Prendre le médicament en début de repas, et à heure régulière.



Comprimés : prendre avec un verre d'eau par voie orale. Il ne faut **pas** écraser, couper ou croquer les comprimés.

Précaution d'emploi

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique au **tédizolide**.



Effets indésirables

Prévention

Conduite à tenir

Diarrhées, nausées, vomissements

Prendre pendant les repas.

Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours, **contactez votre médecin**

Anémie (essoufflement, fatigue)

Bilan biologique hebdomadaire

Fourmillements et baisse de sensibilité des extrémités

Contactez votre médecin

Troubles visuels

Quelques conseils

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical. En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose. En cas de difficultés, vous pouvez contacter votre médecin ou votre pharmacien !