

COMPTE RENDU : PRISE EN CHARGE À L'OFFICINE DE L'ANGINE

Nom Prénom

Age N° de Sécurité Sociale

Nom du Médecin Traitant

Cocher parmi les 5 items celui ou ceux qui correspondent à la situation du patient :

①

Je lui ai délivré un traitement antibiotique conforme aux recommandations suite à la réalisation d'un TROD positif :

Amoxicilline	2 g par jour en 2 prises par jour, pendant 6 jours 50 mg/kg/j en 2 prises par jour par voie orale, sans dépasser 2 g par jour, pendant 6 jours	Clarithromycine	500 mg par jour en 2 prises par voie orale par jour, pendant 5 jours 15 mg/kg/j en 2 prises par voie orale par jour, pendant 5 jours
Céfuroxime axétil	500 mg par jour en 2 prises par jour par voie orale, pendant 4 jours ;		
Cefpodoxime proxétil	200 mg par jour en 2 prises par jour par voie orale, pendant 5 jours ; 8 mg/kg/j en 2 prises par jour par voie orale, sans dépasser la dose adulte de 200 mg par jour, pendant 5 jours		

② **Je lui ai conseillé un simple traitement symptomatique suite à la réalisation d'un TROD négatif.**

③ **Je lui ai également conseillé de consulter rapidement un médecin, en cas de persistance des symptômes >72 h, d'aggravation des symptômes ou d'apparition de nouveaux symptômes.**

4

Je lui ai conseillé de consulter son médecin traitant dans les 24h en raison de l'identification du critère suivant ne permettant pas sa prise en charge en officine :

Age < 10 ans

Recueil insuffisant des informations médicales : non-maîtrise de la langue française, réponses inadap-
tées en l'absence de dossier médical disponible

Retour de voyage en pays tropical depuis 2 à
5 jours et vaccination anti diphtérique non à jour / non
renseignée

Grossesse en cours ou non exclue

Évolution des symptômes depuis plus de 8 jours

Apparition d'une éruption cutanée chez cet enfant

Notion d'insuffisance rénale sévère rapportée par le
patient débit de filtration glomérulaire (DFG) < 30 ml/
mn/1.73m2 selon CKD-EPI

Immunodépression ou risque d'immunodépression dus
à une pathologie (VIH) ou à un médicament (corticothé-
rapie au long cours, immunosuppresseurs, chimiothérapie,
métimazole ou dérivé prescrit pour hyperthyroïdie)

Port d'un cathéter veineux implanté

Antibiothérapie déjà en cours pour une autre raison

Épisode similaire dans les 15 jours précédents

Deux autres épisodes d'odynophagie depuis 6 mois
sans avoir consulté de médecin

Contre-indication à l'utilisation de l'amoxicilline,
céfuroxime, cefpodoxime, clarithromycine,
conformément au résumé des caractéristiques
du produit (RCP)

5

Je l'ai adressé à un médecin en urgence en raison de symptômes de gravité nécessitant une prise en charge médicale immédiate

Température mesurée > 39,5°C

Mesure d'une Pression artérielle Systolique < 90 mm
Hg ou d'une Fréquence Cardiaque > 110/mn ou d'une
Fréquence Respiratoire >20min

Difficulté respiratoire ou pour parler

Trismus (limitation de l'ouverture buccale)

Hypersialorrhée

Cervicalgie ou torticolis limitant les mouvements de la tête

Points divers :